Orfila.

# TRAITÉ

# MÉDECINE LÉGALE

LTLAS.



PARIS,

BÉCHET, JEUNE,

LIBRAIRE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE, Place de l'École de Médecine, 4.

1856

Dicotylédons.

Tab.z.



GRATIOLE officinale GRATIOLA officinalis./Lin./

1. Calice et pistil . 2. Corolle ouverte . a. Etamines rudiment " 5. Id développées " 5. Fruit . a. Phycostime. L'Iruit evoyé horizont " 5. Graine 5. Id . cuyée pour fuire voir l'Emb "



Renonculacées.


.Chémone pulsatille . Ohemone pulsatilla .

t. Etamine . 2. Fruit . 3. Id. coupé longitudinalement . 4. Id. coupé transversalement . 5. Embryon .

#### VEGETAUX.

Monocotylédons.

Tab. 2.




Harcifsée. ...

NARCISSE faux narcisse. NARCISSUS pseudo-narcissus.(Lin.)
(1/2 Grand.nat.)

2. Calice ouvert pour faire voir les bétamines et le phycostème tubuleux et a bord découpé en a.2. Pistil 5. Fruit ; , [id. coupé horizont #5. Graine & [id. coupée vertie # pour faire voir l'emb #:

Dicotylédons.



Renonculacier.

RENONCULE acre. RANUNCULUS acris. (lin.)

s. Calice étamines et pirtils 2. Pétale 3. Leatle . 5. Etamine 1. Pistil . 5. Fruit 6. M coupé verticalem a l'éricarpe 5. Tégument de la graine c. Endosperme à Embryon .



Papavéracées . Chelidoine éclaire . Chelidonium maju.t.:

1. Etamines et pistil . 2. Etamine grossie . 3. Fruit . 4. Graines de grandeur naturelle. 5. Graine grossie . 6. id. coupée .

Dicotylédons.

Tab . 4 .




Solannée.

#### JUSQUIAME noire. HYOSCIAMUS miger (Lin.)

13/2 Grand.nat.

2. Calice et pirtil 2. Corolle ouverte pour faire voir les étamines 5. Etamine vue par le dos 4. An there vue du côle oppose 5. Coupe verticale d'un voaire 6 Fruit accomp d'une partie du calice. 7.Id sipare de son opereule a Opereule & Id coupé horison et g Graine so Id coupée vertical ?



Chicoracées,

Lacture vireuse.

#### VÉGÉTAUX. Dicotylédons.

Tab. 5.



Solance.O.

BELLADONE commune. ATROPA belladona . (Lin.)

(1/2 Grand . nat.)

v. Grolle et etamines a Piciti S. Coppe horizontale d'un fruit accompagné du calice persis-tant L. Graine grossie S. Id. Coppe verticalement a Tojument & Endosperme & Embryon.

Dicotylédons.

Tah.6.



Renonculacéeio:

ACONIT napel.

ACONITUM napellus. (tim.)

(1/2 Grand. nat.)

Pistil; Etamines et corolle .a. Pétales 2. Etamine grossie . 5. Pistils . Fruit . 5. Graine . 6 Id. coupée verticalement, a Tégument & Endosperme c. Embryon ; Embryon isolé.

Dicotylédons.

Tab . 7.



Renonculacée. .

HELLEBORE noir.

HELLEBORUS miger. (Lin.)

(1/2 Grand .nat.)

1. Coupe verticale d'une fleur. 2. Pistils accompagnés d'une étamine et d'un Pétale 2.




Colchicées.

Veratrum Sabadilla .de Poetz . Orfilia Sabadilla .de From . Melanthium .de Thumberg .

l.Etamines, 2.Etamines et onaire . 3. Capsule . 4. Id. compée . 3. Capsule ouverte . 6. Graines grossies

Dicotylédons.

Tah. 8.



Solancex.

DATURA épineux.
DATURA stramonium. (tin.)

(3/2 Grand.nat:)

1. Corolle ouverte et étamines 2 Pietil 3. Fruit coupé horizontalement . 4. Graine grossie. 5 Id coupée verticalement.

Dicotylédons.

Tab.g.




Personcer.

DIGITALE pourprée. DIGITALIS purpurea . (Lin.)

s. Partie inférieure d'une corolle ouverte et étamines 2. Truit coupé horizon-talement 5. Graine grossie 4. Id. vue du côté anguleux 5. Id. coupée verticalent ; pour fiure voir la situation de l'embryon .

Dicotylédons.

Tah.10.




Cmbellifere.O. CIGUE commune./Grande cigüe./ CICUTA major. [Lam.] (Contum maculatum L.)

s.Portion de tige .a. Næud -vital & Embryon - fixe développé en rameau .a. Fleur. 5. Fruit !4. Id-grossi 5. Id. coupé horizontalement & Moitié d'un fruit coupé dans sa longueur. 7 Embryon .

Dicotyledons.

Tah. II.



Ombelliferex.

CICUTA maculata (4)
[1/2] frand.nat/)
3. Flour 2. Omballs et amballset et fraits 5. Fruit 5. Id. tol qu'il s'ouvre dans la maturité 5. Id. coupé horrantalement.

Dicotylédons.

Tab.11.bis.



Cmbellifere.O. CIGUË vireuse.


CICUTA virosa .L. (Cicutaria aquatica . Lamk.)

(3/2 Grand.nat.)

1. Fleur. 2. Fruit.

Dicotylédons.

Tab. 12.



A ETHUSA petite cigüe.


ETHUSA eynapium. (Lin.)

B. Apium petroselinum. (Lin.) (Persil.)

B. A. Duun. perosecutum. pun j teesen.
A. Haur. Ombell et ombellules de frait. 5. Fruit. 4 de copé verdicalement : a. Féricarpe .
b. Sammete libres des ordins playcosteme. J. Teyument de la graine d. Endosporme .
c. Embryon. 5. Embryon. B. a. Ombellule . 2. Flour. 5. Fruit.

Dicotylédons.

Tab.13.



CENANTHE safrance.

(½ trand nat ) 1. Racine multitubéreuse 2. Eleur irrégulière de la circonférence d'une ombellule . 3. Fleur régulière du centre d'une ombellule 2. Éruit

Acotyledons.

Tab.14.



(hampignen. C.
(ORONGE FAUSSE.

(AMANTA pseudo-aurantiaea litali / loporicus muscarius DC) 1.a. Coupe verticale d'un individu développé . D. Jeune individu.

2. AVAVITI venenosa.

### VEGETAUX.

Acotylédons.

Tab.15.



Champignon.C.

ORONGE cigüe blanche. AMANITA bulbosa alba . (Paul.) ORONGE cigiie verte .

- ORONGE cigüe jannatre.
  - AMANTA citrina . (Paul.)

AMANITA viridis . (Paul.)


· 3 · a · Jeune individu ·

2.a. Id . avant son développement.

#### VEGETAUX.

Acotylédons.

Tab. 16



Champignen.O.

ORONGE croix de malte. HYPOPHILLUM crux melitensis Pand

ORONGE souris.

HYPOPHILLUM anguineum Paul 2.a. Id .coupé verticalement .

ORONGE peaucière depicardic.

(HIPOPHILUM pellitum./faul.)


(ORONGE dartreuse.

HYPOPHILLUM maculatum /Paul/

#### VEGÉTAUX.

Acotylédons.

Tab. 17.



ORONGE blanche ou citronnée.

(IXPOPHILIEM albo-citrinum. (Paul.)
1.a. Id. plus agée.

ORONGE à pointe de trois quart :

ORONGE à rape.


5.a. Id. vue en dessous. LAITEUX pointu rougisant

HIPOP \_ pudibundum. (Paul.)

#### VEGETAUX.

Acotylédons.

Tab.18.




AGARIC acre. AGARIC brulant. AGARICUS acris. Bull 3.2 Jeune individu. AGARICUS urens . (Bull.)

AGARIC styptique. AGARIC pyrogale. AGARICUS stypticus. (Bull.) AGARICUS pyrogahus./Bu

#### VEGETAUX.

Acotylédons.

Tab.19.



Turpin fils pinz!

Champignon C.

Dien couls

| AGARIC annulaire. | AGARICUS annularius | Bull | | AGARIC styptique.

AGARICUS stypticus Bull /

AGARIC meurtrier.


AGARICUS necator. [Bull.]

AGARIC laiteux acre.

AGARICUS lactifluus acris. [Bull.]

4. a. Le même moins développé.

Plie pere soule!



Ophidien O.

Memier pinx!

VIPERE commune.


1/3 (rand not.)

L'ête vue de profit de grandeur naturelle ». Cilande qui oceréte le fluide venimeux ». Canal excréteur de la glande « Peche de la gencine contenant les
dents maxillaire» « . Dent maxillaire en action .

NIMAUA.

INVERTEBRES. Entomologie.

Tab . 21.



iorjust

ARAIGNÉE tarentule. Lycosa tarentula. (Labr.)

2.ARAIGNÉE des caves. Segestria collaria. (Labr.)

5.SCORPION d'Europe. Norprio. Europeus. (Labr.)

4.CANTHARIDE officinale. Cantharie vocicatoria. (Labr.)

5.BOLROD des pierres. Bombus tapidarias. (Labr.)

6.GUÉPE commune. Ferpa vulgarir. (Liv.)

6.GUÉPE commune.

7.GUEPE frelon. Vespa crabro (lin.) 8.ABEILLE domestique . 1pis mellifera . (lin.)